



Secretaría
NACIONAL
ANTIDROGAS

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

SENAD



Quinto estudio sobre:
**PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS,
FACTORES DE RIESGOS Y PREVENCIÓN**
EN JÓVENES ESCOLARIZADOS
DE 12 AÑOS Y MÁS.

OBSERVATORIO PARAGUAYO DE DROGAS
OPD / SENAD

2023



PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN EN JÓVENES ESCOLARIZADOS DE 12 AÑOS Y MÁS

Institución Responsable del Estudio

Secretaría Nacional Antidrogas

Dirección de Observatorio Paraguayo de Drogas

Dirección General de Reducción de la Demanda de Drogas

AGRADECIMIENTOS

El presente documento ha sido elaborado con el valioso aporte, cooperación y esfuerzo de las diferentes Direcciones Generales, de la Secretaría Nacional Antidrogas y la cooperación de las Oficinas Regionales Departamentales.

Dirección General Antidrogas – Agte. Esp. Sup. Gral. Edgar Almada

Oficina Regional Departamental N° 1. Pedro Juan Caballero. – Agte. Esp. Sup. Gral. Nelson López

Oficina Regional Departamental N° 2. Ciudad del Este. – Agte. Esp. Sup. Gral Abg. Julio Alcaraz

Oficina Regional Departamental N° 3. Encarnación. – Agte. Esp. Sup. Abg. Hugo Morales.

Oficina Regional Departamental N° 7. Concepción. – Agte. Esp. Sup. Marcelo Benítez.

Oficina Regional Departamental N° 8. San Ignacio Guazu. – Agte. Esp. Sup. Lilian Solís.

Dirección del SIU. – Agte. Esp. Sub Insp. Daniel Fernández

Dirección General de Reducción de la Demanda de Drogas. – O.T. Rosa Emerenciana Saldivar

Dirección General de Administración y Finanzas. – C.P. Leticia Franco.

Directores/as de Centros de Tratamiento.

Referentes de grupos de autoayuda (Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos)

AUTORIDADES

Secretaría Nacional Antidrogas

- **Abg. Cont. Zully Graciela Rolón Esquivel**, Ministra Secretaria Ejecutiva.
- **Agte. Esp. Esteban Ramón Caselli Díaz de Bedoya**, Secretario Ejecutivo Adjunto.

FICHA TÉCNICA

Equipo Técnico

- **Abg. Mgt. Elba Alicia Escobar Fernández**, Directora de la Dirección de Observatorio Paraguayo de Drogas
- **Ing. Manuel Antonio Benítez Franco**, Jefe del Departamento de Investigación Epidemiológica
- **Lic. Nelson Vidal Riveros Silva**, Equipo técnico Dirección de Tratamiento
- **Agte. Esp. Lic. Mgt. Pedro Eduardo Ucedo Ruíz**, Equipo Técnico - DGA

Colaboradores

- **Lic. María Laura Báez de García**, Jefe del Departamento de Documentación
- **Func. Kamila Belén Pérez López**, Observatorio Paraguayo de Drogas
- **Asp. Iván Marcelo Oviedo Penayo**, Observatorio Paraguayo de Drogas
- **Asp. Joel Samuel Fernández Caballero**, Observatorio Paraguayo de Drogas

Diseño y Diagramación

- **Lic. Angel Rodrigo Aveiro Chaparro**, Jefe del Departamento de Diseño y Publicaciones
- **Func. Mónica Susana Ortigoza Vera**, Asistente de Diseño
- **Lic. Fátima Beatriz Cañiza Ovelar**, Jefa del Departamento de Comunicación Interna

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio hace referencia al comportamiento de los jóvenes paraguayos en cuanto al consumo de sustancias lícitas e ilícitas, el resultado del mismo es un gran esfuerzo realizado por la gestión de la Ministra actual, para así contar con estudios de rigor científico que puedan servir de base para la toma de decisiones y planes de políticas públicas nacionales a fin de afrontar de manera eficaz y eficiente el problema. -

Debemos de tener en cuenta que el consumo sigue avanzando y es una problemática social con un impacto desfavorable no solo a nivel de salud, sino educacional, se ven afectadas la calidad de vida de los habitantes y más en los grupos vulnerables que son las etapas de la niñez y la adolescencia.

Desde el punto de vista social parece que todas medidas tomadas no son suficientes a fin de contrarrestar la problemática, teniendo en cuenta que se ha multiplicado la oferta tanto en cantidad y variedad, por lo que van apareciendo más sustancias. Hay que tener en cuenta que la puerta de entrada a las sustancias ilícitas para muchos adolescentes y jóvenes, la abre el consumo de alcohol y el tabaco, dentro de este escenario de sustancias lícitas aparece el vapedor con sus diferentes esencias, inclusive como lo vamos a ver en este estudio el mismo se encuentra por encima del tabaco, en cuanto al consumo, son socialmente aceptadas y de fácil acceso, no solo por el costo sino de los lugares de expendio o venta de los mismos. Si bien existen normativas legales al respecto sobre la prohibición de ventas de dichas sustancias las mismas son totalmente vulnerables por el nulo control.-

Todos los hallazgos realizados en el presente estudio confirman lo que ya hemos acotado anteriormente que prevalece el consumo de alcohol y el vapedor en la mayor parte de los jóvenes, sin obviar la presencia de otras sustancias pero ya ilícitas y de más difícil acceso.-

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS


Descripción sociodemográfico:

El diseño sociodemográfico facilita a la investigación las características sociales de la población estudiada, a través de un conjunto de indicadores.

Para esta investigación se ha tenido la participación de jóvenes escolarizados de instituciones educativas de gestión pública, privada y subvencionada.


En este estudio fueron encuestados estudiantes del turno mañana, tarde y noche del 8vo grado de la Educación Escolar Básica, 1º y 3º curso de la Educación Media, que comprenden las edades aproximadas de 12 a 17 años y más.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN SEXO.




En el presente gráfico notamos que el 54,9% corresponde a la participación de las mujeres en la encuesta y el 45,1% corresponde a los del sexo masculino.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRAS, SEGÚN ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.



En el presente gráfico podemos notar que el 54,7% de las instituciones educativas a las que tuvimos acceso fueron públicas y el 31,3% del sector privado y solo el 14,1% de carácter subvencionado. Esto obedece a que en los departamentos que hemos realizado la encuesta en los cursos o grados correspondientes existen más instituciones de carácter público.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA, SEGÚN ZONA.



En el siguiente cuadro podemos notar la distribución de la población escolar según el rango de edad y la ciudad que le corresponde. En la ciudad de Caacupé el 5,5% de la población escolar fue encuestada; Fram el 3,0%; Capiatá el 22,4; Pedro Juan Caballero 11,2%; Ciudad del Este 13,1%; Encarnación 13,4%; Pilar 5,4%; Atyrá 2,6%; Yby Yau 3,9%; Horqueta 8,9% y Concepción 10,5%. La población escolar encuestada era la que estaba al momento de realización de la misma.

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Prevalencia del Consumo de Bebidas Alcohólicas, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	49,8	29,7	27,6
Femenino	50,2	27,8	24,3
Total	58,0	57,4	29,8

El 50,2% de las estudiantes mujeres señalan haber probado bebidas alcohólicas alguna vez en su vida y 49,8% lo hicieron los hombres.

El 29,7% de los varones habrían consumido bebidas alcohólicas en el último año y 27,8% lo hicieron las mujeres.

El 27,6% de los estudiantes del sexo masculino habrían consumido bebidas alcohólicas en el último mes y 24,3% lo hicieron las del sexo femenino.

Incidencia del consumo de bebidas alcohólicas, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	31,8	25,5
Femenino	29,6	22,7
Total	30,7	24,1

El 29,6% de las estudiantes femeninas han señalado que han probado alcohol durante el año y el 22,7% que lo probó durante el mes en relación al mes que hemos realizado la encuesta. En tanto en los varones el 31,8% ha señalado haber probado alcohol durante el año y el 25,5%, reconoce haber probado durante el mes.

Prevalencia de consumo de Bebidas alcohólicas, en estudiantes, según grado/curso

Sexo	Vida	Año	Mes
Octavo	40,3	21,4	11,9
Primer C.	62,7	42,7	26,4
Tercer C.	71,5	56,9	38,4

En el octavo grado el 40,3% de los encuestados ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, 21,4% en el último año, mientras el 11,9% lo realizaron este último mes.

Primer C. afirma en un porcentaje de 62,7% haber consumido alguna vez en su vida. Seguidamente el 42,7% este año, y en el último mes el 26,4%.

Tercer C. menciona que 71,5% de los encuestados han consumidos alcohol alguna vez en su vida, mientras tanto el 56,9% en el último año y el 38,4% este último mes.

Prevalencia de consumo de Bebidas Alcohólicas, en estudiantes, según grupo etáreo

Sexo	Vida	Año	Mes
Hasta 14 años	40,7	21,9	13,8
de 15 a 16 años	61,8	41,5	27,1
de 17 años y más	70,8	52,1	31,6

Los estudiantes de 14 años afirman en 40,7% haber probado alguna vez en su vida, 21,9% en el último año y el 13,8% este último mes. Los encuestados de 15 a 16 años han referido que el 61,8% ha consumido bebidas alcohólicas este año. Seguidamente el 27,1% el último mes. Mientras tanto los jóvenes de 17 años y más en un porcentaje mayor de 70,8% han probado el alcohol alguna vez en su vida, el 52,1% en el último año y el 31,6% este último mes.

CONSUMO DE TABACO**Prevalencia de consumo de tabaco, en estudiantes, según sexo y total**

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	7,1	2,3	0,7
Femenino	6,0	2,4	0,5
Total	13,1	4,7	1,2

El 7,1% de los estudiantes encuestados han referido consumo de tabaco alguna vez en la vida, el 2,3% fumo la sustancia en el último año y el 0,7 en el último mes. Las mujeres encuestadas han mencionado en un 6,0% haber consumido tabaco alguna vez en la vida, mientras que en el último año refieren el 2,4% y el 1,2% en el último mes. En total tenemos un porcentaje de 13,1% en cuanto a la prevalencia de vida, el 4,7% este último año por último 1,2% este último mes.

Incidencia del consumo de tabaco, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	2,1	0,6
Femenino	2,0	0,5
Total	2,5	0,6

Según los datos obtenidos el 2,1% de los estudiantes masculinos encuestados han consumido tabaco el último año y el 0,6% este último año. Mientras tanto el 2,0% de las femeninas han tenido relación con el tabaco este último año y el 0,5% este mes. Los datos arrojan un porcentaje total del 2,05% de consumo este año y el 0,6% de incidencia en el último mes.

Prevalencia de consumo de tabaco, en estudiantes, según grado/curso

Grado / Curso	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Octavo	8,7	2,3	0,9
Primer C.	12,4	9,7	3,7
Tercer C.	18,1	12,5	6,1

En el octavo grado el 8,7% de los encuestados ha consumido tabaco alguna vez en su vida, 2,3% en el último año, mientras el 0,9% lo realizaron este último mes.

Primer C. afirma en un porcentaje de 12,4% haber consumido alguna vez en su vida. Seguidamente el 9,7% este año, y en el último mes el 3,7%.

Tercer C. menciona que 18,1% de los encuestados han consumido tabaco alguna vez en su vida, mientras tanto el 12,5% en el último año y el 6,1% este último mes.

Prevalencia de consumo de tabaco, en estudiantes, según grupo etáreo

Grupo etáreo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Hasta 14 años	9,2	6,8	1,1
Hasta 14 años	18,7	10,3	4,5
de 17 años y mas...	22,4	15,1	7,6

Los estudiantes de 14 años afirman en 9,2% haber probado alguna vez en su vida, 6,8% en el último año y el 1,1% este último mes. Los encuestados de 15 a 16 años han referido que el 18,7% ha consumido tabaco alguna vez en su vida y el 10,3% este año. Seguidamente el 4,5% el último mes. Mientras tanto los jóvenes de 17 años y más en un porcentaje mayor de 22,4% han probado el consumo de tabaco alguna vez en su vida, el 15,1% en el último año y el 7,6% este último mes.

CIGARRILLO ELECTRONICO (VAPER)

Prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico (vaper), en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	21,3	11,7	9,2
Femenino	21,2	11,0	6,7
Total	42,5	22,7	15,9

Según los datos obtenidos el 21,3% de los estudiantes masculinos encuestados han consumido el cigarrillo eléctrico (vaper), alguna vez en su vida, mientras el 11,7% este último año. Seguidamente el 9,2% este último mes.

El 21,0% de las femeninas han tenido relación con el cigarrillo eléctrico (vaper) alguna vez en su vida, el último año 11,0% de las estudiantes y el 0,5% este mes.

Los datos arrojan un porcentaje del 42,5% de consumo alguna vez en su vida y el 22,7% de prevalencia en el último año y 15,9% de este mes.

Incidencia del consumo de tabaco, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	9,8	6,4
Femenino	9,2	4,9
Total	9,5	5,7

Según los datos obtenidos el 9,8% de los estudiantes masculinos encuestados han consumido tabaco el último año y el 6,4% este último mes. Mientras tanto el 9,2% de las femeninas han tenido relación con el tabaco este último año y el 4,9% este mes.

Los datos arrojan un porcentaje total del 9,5% de consumo este año y el 5,7% de incidencia en el último mes.

Prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico (vaper), en estudiantes, según grado/curso

Grado / Curso	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Octavo	10,9	6,3	2,1
Primer C.	21,4	10,5	5,6
Tercer C.	31,2	14,3	8,3

En el octavo grado el 10,9% de los encuestados ha consumido el cigarrillo eléctrico (vaper) alguna vez en su vida, 6,3% en el último año, mientras el 2,1% lo realizaron este último mes.

Primer C. afirma en un porcentaje de 21,4% haber consumido alguna vez en su vida. Seguidamente el 10,5% este año, y en el último mes el 5,6%.

Tercer C. menciona que 31,2% de los encuestados han consumido el cigarrillo eléctrico (vaper) alguna vez en su vida, mientras tanto el 14,3% en el último año y el 8,3% este último mes.

Prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico (vaper), en estudiantes, según grupo etáreo

Grupo etáreo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Hasta 14 a	9,8	6,1	1,8
de 15 a 16 a	19,4	9,3	4,7
de 17 a...	29,6	11,3	7,6

Los estudiantes de 14 años afirman en 9,8% haber probado alguna vez en su vida el cigarrillo eléctrico, 6,1% en el último año y el 1,8% este último mes. Los encuestados de 15 a 16 años han referido que el 19,4% lo han consumido alguna vez en su vida. Seguidamente el 9,3% el último año y el 4,7% este último mes. Mientras tanto los jóvenes de 17 años y más en un porcentaje mayor de 29,6% han probado el consumo del cigarrillo eléctrico alguna vez en su vida, el 11,3% en el último año y el 7,6% este último mes.

CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA

Prevalencia de Tranquilizantes sin receta médica en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	1,8	0,9	0,3
Femenino	2,9	1,2	0,8
Total	4,7	2,1	1,0

Los estudiantes encuestados manifiestan el total de las tres prevalencias en 4,7%, 2,1% y 0,8% respectivamente.

En cuanto a los hombres encuestados escolarizados refieren haber consumido tranquilizantes sin receta médica alguna vez en la vida, 1,8%, el 0,9% en el último año y el 0,3% en el último mes.

En tanto, las mujeres encuestadas refieren haber consumido tranquilizantes sin receta médica alguna vez en la vida en un 2,9%, el 1,2% en el último año y el 0,8% en el último mes, de este cuadro notamos que existen un mayor consumo de tranquilizantes sin receta médica en las mujeres, siendo esta la de mayor porcentaje para las tres categorías.

Incidencia del consumo de tranquilizantes sin receta médica, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	0,9	0,1
Femenino	1,1	0,5
Total	1,0	0,3

El 0,9% de los hombres escolarizados manifiestan haberse iniciado en el consumo de tranquilizantes sin receta médica durante el último año, mientras que 0,1% se inició por primera vez en el último mes previo a la realización de la encuesta.

El 1,1% lo que representa a mujeres escolarizadas manifiestan haber consumido tranquilizantes sin receta médica por primera vez durante el último año, mientras que el 0,5% dicen que lo hicieron en el último mes.

Las mujeres se iniciaron en mayor porcentaje, en tanto en el último año como en el último mes en comparación con los hombres.

Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta médica, en estudiantes, según grado/curso

Grado / Curso	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Octavo	1,7	0,7	0,3
Primer C.	2,7	1,1	0,7
Tercer C.	3,5	1,9	0,9

Los estudiantes encuestados que asisten al octavo grado manifestaron en un 1,7% haber consumido tranquilizantes sin receta médica en algún momento de su vida, el 0,7% en el último año y el 0,3% en el último mes antes de la encuesta.

En el primero de la media, el 2,7% de los estudiantes encuestados señalaron consumo de tranquilizantes en alguna oportunidad de su vida, el 1,1% en el último año y el 0,7% en el mes previo al estudio.

El 3,5 de los estudiantes encuestados que cursan el tercero de la media, señalan haber probado alguna vez en su vida, tranquilizantes sin receta médica, el 1,9% el último año y el 0,9% en el mes de la investigación.

Prevalencia de consumo de tranquilizantes sin receta médica, en estudiantes, según grupo etáreo

Grupo etáreo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Hasta 14 años	1,5	0,5	0,2
de 15 a 16 años	2,4	0,9	0,5
de 17 años y más...	3,3	1,5	0,8

El 1,5% de los estudiantes encuestados de hasta 14 años han señalado consumo de tranquilizantes sin receta médica alguna vez en la vida, el 0,5% en el último año y el 0,2% en el último mes antes de la investigación.

Los estudiantes encuestados de 15 a 16 años, refieren en un 2,4% haber consumido esta sustancia en algún momento de su vida, el 0,9% en el último año y el 0,5% en el último mes.

De 17 años y más, son los estudiantes encuestados que han señalado en un 3,3% haber probado tranquilizantes sin receta médica alguna vez en su vida, el 1,5% en el último año y el 0,8% en el último mes.

CONSUMO DE ESTIMULANTES SIN RECETA MÉDICA

Prevalencia de consumo de estimulantes sin receta médica, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	4,0	1,6	0,7
Femenino	2,7	1,1	0,5
Total	6,7	2,8	1,2

Los estudiantes encuestados han referido en un 6,7% el consumo de estimulantes sin receta médica alguna vez en la vida, de ello el 2,8% continuaba con el consumo en el último año y el 1,2% en el último mes.

Los hombres encuestados mencionaron el 4,0% corresponde al consumo de alguna vez en la vida, el 1,6% en el último año y el 0,7% en el último mes.

El 2,7% de las mujeres escolarizadas encuestadas señalaron haber consumido estimulantes sin receta médica, 1,1% durante el último año y 0,5% en el último mes.

Incidencia del consumo de estimulantes sin receta médica, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	2,6	1,1
Femenino	1,8	1,0
Total	2,2	1,1

El 2,6% de los hombres escolarizados manifiestan hacerse iniciado en el consumo de estimulantes sin receta médica durante el último año, mientras que el 1,1% se inició por primera vez en el último año.

El 1,8% de las mujeres que participaron de la encuesta manifiestan haber consumido estimulantes sin receta médica por primera vez durante el último año, mientras que el 1,1% por primera se iniciaron en el mes previo a la encuesta.

Los varones se iniciaron en mayor porcentaje en el último año y mes en comparación con las mujeres.

Prevalencia de consumo de estimulantes sin receta médica, en estudiantes, según grado/curso

Grado / Curso	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Octavo	2,1	1,1	0,4
Primer C.	2,3	1,3	0,5
Tercer C.	2,5	1,4	0,7

En el octavo grado con relación al consumo de estimulantes corresponde al 2,1% a prevalencia vida, el 1,1% a prevalencia año y el 0,4% a prevalencia mes.

En el primer curso de la media con relación al consumo de estimulantes corresponde al 2,3% a prevalencia vida, el 1,3% a prevalencia año y el 0,5% a prevalencia mes.

En el tercer curso de la media con relación al consumo de estimulantes corresponde al 2,5% a prevalencia vida, el 1,4% a prevalencia año y el 0,7% a prevalencia mes.

Prevalencia de consumo de estimulantes sin receta médica, en estudiantes, según grupo etáreo

Grupo etáreo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Hasta 14 años	2,1	1,3	0,4
de 15 a 16 años	2,4	1,1	0,5
de 17 años y más	2,6	1,5	0,9

Los estudiantes encuestados de hasta 14 años señalan en un 2,1% haber consumido estimulantes sin receta médica en algún momento de su vida, el 2,4% de los encuestados de 15 a 16 años y de 17 años y más han referido la misma situación en un 2,6%.

Los estudiantes encuestados de 15 a 16 años señalan en un 2,4% haber consumido estimulantes sin receta médica por primera vez durante el último año, el 1,1% de los encuestados de 15 a 16 años y de 17 años y más han referido la misma situación en un 1,5%.

Los estudiantes encuestados de hasta 14 años señalan en un 0,4% haber consumido estimulantes sin receta en el mes de participar de la encuesta, el 0,5% de los encuestados de 15 a 16 años y de 17 años y más han referido la misma situación en un 0,9%.

CONSUMO DE MARIHUANA

Prevalencia de consumo de marihuana, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	5,1	4,2	2,3
Femenino	2,9	1,7	1,0
Total	8,0	6,0	3,3

Los jóvenes escolarizados encuestados han referido en un 8,0% en el consumo de marihuana alguna vez en la vida, el 6,0% continuaba con el consumo en el último año y el 3,3% en el último mes.

Los hombres encuestados mencionaron el 5,1% al consumo de marihuana alguna vez en la vida, el 4,2% en el último año y el 2,3% en el último mes.

En tanto, para las mujeres encuestadas el 2,9% corresponde al consumo de marihuana alguna vez en la vida, el 1,7% en el último año y el 1,0% en el último mes.

Incidencia del consumo de marihuana, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	3,9	1,8
Femenino	1,5	1,1
Total	2,7	1,5

El 3,9% de los hombres escolarizados manifiestan haberse iniciado en el consumo de marihuana durante el último año, mientras que el 1,8% se inició por primera vez en el mes previo a la realización de la encuesta.

El 1,5% de las mujeres escolarizadas manifiestan haber consumido marihuana por primera vez durante el último año, mientras 1,1% por primera vez se iniciaron en el último mes.

Los hombres se iniciaron en mayor porcentaje en el último año y en el último mes en comparación con las mujeres.

Prevalencia de consumo de marihuana, en estudiantes, según grado/curso

Grado / Curso	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Octavo	2,4	1,3	1,0
Primer C.	7,0	1,3	2,9
Tercer C.	8,6	5,5	3,3

En el octavo grado con relación al consumo de marihuana el 2,4% corresponde a prevalencia vida, al 1,3% prevalencia año y 1,0% prevalencia mes.

En el primer curso de la media con relación al consumo de marihuana el 7,0% corresponde a prevalencia vida, al 4,5% prevalencia año y 2,9% prevalencia mes.

En el tercer curso de la media con relación al consumo de marihuana el 8,6% corresponde a prevalencia vida, al 5,5% prevalencia año y 3,3% prevalencia mes.

Prevalencia de consumo de marihuana, en estudiantes, según grupo etáreo

Grupo etáreo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Hasta 14 años	2,6	1,2	0,9
de 15 a 16 años	6,6	4,1	2,7
de 17 años y más	8,4	5,5	3,1

Los estudiantes que participaron del estudio de hasta 14 años, manifiestan en un 2,6% consumo de marihuana en alguna oportunidad de la vida, el 1,2% en el último año y el 0,9% en el último mes. Los estudiantes que participaron del estudio de 15 a 16 años, manifiestan en un 6,6% consumo de marihuana en alguna oportunidad de la vida, el 4,1% en el último año y el 2,7% en el último mes. Los estudiantes que participaron del estudio de 17 años y más, manifiestan en un 8,4% consumo de marihuana en alguna oportunidad de la vida, el 5,5% en el último año y el 3,1% en el último mes.

CONSUMO DE COCAÍNA

Prevalencia de consumo de cocaína, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	1,2	0,9	0,9
Femenino	0,5	0,4	0,1
Total	1,7	1,3	1,0

Los hombres encuestados han señalado en un 1,2% haber consumido cocaína en algún momento de la vida, el 0,9% en el último año y en igual porcentaje en el último mes. Con relación a las mujeres escolarizadas manifiestan en un 0,5% haber consumido alguna vez en la vida, el 0,4% en el último año y el 0,1% en el último mes. Por lo tanto, el total expuesto entre hombres y mujeres refieren que en un 1,7% el consumo de cocaína en algún momento de la vida, el 1,3% seguía consumiendo en el año y el 1,0% mantenía su consumo en el último mes antes del estudio.

Incidencia del consumo de cocaína, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	1,2	0,7
Femenino	0,9	0,4
Total	1,1	0,6

El 1,2% de los hombres escolarizados manifiestan haberse iniciado con la cocaína durante el último año y el 0,7% en el último mes previo a la realización de la encuesta.

Las mujeres encuestadas manifiestan en un 0,9% haber consumido por primera vez en el último año, y en el último mes manifiestan un 0,4%.

Los hombres se iniciaron en mayor porcentaje en el último año y en el último mes en comparación con las mujeres.

Prevalencia de consumo de cocaína, en estudiantes, según grado/curso

Grado / Curso	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Octavo	1,1	0,7	0,5
Primer C.	2,2	1,5	0,7
Tercer C.	2,5	1,7	0,8

Los estudiantes del 8vo grado, manifestaron haber consumido cocaína alguna vez en un 1,1%, el 0,7% en el último año y el 0,5% en el último mes.

Los jóvenes estudiantes del 1er curso de la media, señalaron haber consumido cocaína alguna vez en un 2,2%, el 1,5% en el último año y el 0,7% en el último mes.

Los jóvenes escolarizados del 3er curso de la media, mencionaron haber consumido cocaína alguna vez en un 2,5%, el 1,7% en el último año y el 0,8% en el último mes.

Prevalencia de consumo de cocaína, en estudiantes, según grupo etáreo

Grupo etáreo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Hasta 14 años	1,1	0,5	0,3
de 15 a 16 años	1,6	1,0	0,4
de 17 años y más...	2,0	1,7	1,0

El 1,1% de los estudiantes de hasta 14 años manifestaron haber consumido cocaína alguna vez en la vida, el 0,5% en el último año y 0,3% en el último mes.

El 1,6% de los estudiantes de 15 a 16 años manifestaron haber consumido cocaína alguna vez en la vida, el 1,0% en el último año y 0,4% en el último mes.

El 2,0% de los estudiantes de 17 años y más manifestaron haber consumido cocaína alguna vez en la vida, el 1,7% en el último año y 1,0% en el último mes.

CONSUMO DE COCAINA FUMABLE (PASTA BASE, CHESPI O CRACK)

Prevalencia de consumo de cocaína fumable, (pasta base, chespi o crack), en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	1,0	0,8	0,7
Femenino	0,1	0,0	0,0
Total	1,0	0,9	0,7

El 1,0% de los encuestados del sexo masculino han señalado consumo de cocaína fumable en algún momento de la vida, el 0,8% en el último año y el 0,7 en el último mes. En tanto, las mujeres refieren en un 0,1% en algún momento de la vida. En tanto, el total expuesto entre varones y mujeres refieren en un 1,0% e consumo de la sustancia en alguna oportunidad de la vida, el 0,9% en el último año y 0,7 en el último mes.

Prevalencia de consumo de cocaína fumable, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Año	Mes
Masculino	0,8	0,7
Femenino	0,0	0,7
Total	0,4	0,4

El 0,8% de los hombres escolarizados manifiestan haberse iniciado en el consumo de cocaína fumable durante el último año, mientras que el 0,7% se inició por primera vez en el último mes previo a la realización de la encuesta.

CONSUMO DE ÉXTASIS

Prevalencia de consumo de éxtasis, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Prevalencia Vida	Prevalencia Año	Prevalencia Mes
Masculino	0,8	0,5	0,5
Femenino	0,1	0,1	0,0
Total	0,9	0,6	0,5

El 0,8% de los encuestados hombres han señalado consumo de éxtasis en algún momento de la vida, el 0,5% en el último año y el 0,5% en el último mes.

En tanto las mujeres refieren en un 0,1% en el consumo de la sustancia en alguna oportunidad de la vida, y el 0,1% en el último año.

En total, el total entre hombres y mujeres el 0,9% en el consumo de la sustancia en algún momento de la vida, el 0,6% sigue consumiendo en el último año y el 0,5% en el último mes.


Incidencia del consumo éxtasis, en estudiantes, según sexo y total

Sexo	Incidencia Año	Incidencia Mes
Masculino	0,5	0,3
Femenino	0,1	0,0
Total	0,3	0,2

El 0,5% de los hombres escolarizados manifiestan haberse iniciado en el consumo de éxtasis durante el último año, mientras que el 0,1% se inició por primera vez en el último mes previo a la realización de la encuesta.

El 0,1% de las estudiantes mujeres manifiestan haber consumido éxtasis por primera vez durante el último año.

EDAD DE INICIO



En el gráfico notamos que la edad de inicio o el primer contacto con la sustancia se da a los 13,8 años de edad, a los 14,2 años para el tabaco, el vaper o cigarrillo electrónico manifiestan los jóvenes encuestados que su primer contacto con la sustancia fue a los 14,8 años.

De la misma manera manifiestan los jóvenes escolarizados la marihuana a los 14,7 años, la cocaína a los 15 años, seguido por el chespi a los 15,2 años de edad.



Escaneá y seguinos en las redes

